

Las verrugas genitales, continuado

Muchos de los tipos de PVH son conocidos por causar el cáncer cervical. El tratamiento para quitar verrugas no es siempre efectivo, y ellos a menudo reocupen el área. Ahora, hay una nueva vacuna en el mercado llamó Gardasil, que puede prevenir varios tipos de PVH que pueden causar el cáncer cervical. Es recomendado para todas las chicas, las vírgenes, y mujeres sexualmente activas bajo del edad 26.

Las ladillas:

Las ladillas son conocidos como "cangrejos" y son muy contagiosos. Son parte de un grupo de insectos parasitarios llamados piojos. Una sola ladilla agarrará el vello púbico con sus garras y atascará su cabeza en la piel del anfitrión donde come la sangre de pequeños vasos sanguíneos. Las ladillas pueden ser transmitidas por el contacto sexual, y en veces por medio de compartir ropa. Los individuos que son infectados con las ladillas experimentarán algunas sensaciones de picadura, y no habrá alivio de rasguñar el área. Las ladillas son tratables, generalmente con cremas y aclarados que pueden ser encontrado en tiendas de droga sin una prescripción. Son llamados Rid™ and Nix™

VIH & SIDA:

Ve por favor el folleto específico del VIH y SIDA para información detallada de estas enfermedades.

Recursos

Seattle

Clinica Internacional de Harborview
206-731-4192

Clinica Harborview STD Clinic
206-205-7837

Teléfono rojo de VIH/ETS
206-205-7837

En línea:

www.metrokc.gov/health/

www.metrokc.gov/health/famplan/clinics.htm

<http://www.sexualhealth.com/>

Toda la información de "Our Sexuality" by Robert Crooks and Karla Baur. Pub: Thomson Wadsworth. Belmont CA. 2005

Al-Shifa Clinic

Dirección del correo electrónico:
alshifa@u.washington.edu

Página Web: <http://students.washington.edu/alshifa>

Las enfermedades de transmisión sexual

Protégete y a tus socios



¿Qué son ETS's?

Enfermedad de transmisión sexual (ETS) es un grupo de enfermedades que son usualmente transmitidos por contacto sexual, incluyendo coito, sexo oral y sexo anal. Cada ETS es asociada con riesgos de la salud, algunos más serios que otros.

El linfogranuloma venéreo

El linfogranuloma venéreo es causada por *Chlamydia trachomatis*, una bacteria que crece en células de cuerpo. Las infecciones del linfogranuloma venéreo están entre los más comunes de todos ETS's y son causa de la ceguera más evitable en el mundo. El linfogranuloma venéreo es transmitido principalmente por contacto sexual. Un signo del linfogranuloma venéreo es una inflamación del tubo uretral, que puede causar el ardor durante el orine, o en una infección de la cerviz, a veces acompañado del flujo. La infección puede esparcir al útero y la cavidad pélvica que pueden causar cicatrices permanentes llamadas la enfermedad incitante pélvica. Las mujeres especialmente pueden tener el linfogranuloma venéreo y no muestran ningún signo ni los síntomas. El linfogranuloma venéreo es diagnosticada tomando la muestra de orina o estropajo de algodón y realizando las técnicas de la amplificación de ADN. Es tratable con antibióticos.

La gonorrea:

La gonorrea es un ETS causado por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*. La bacteria gonococcus vive en las mucosas tibias de los genitales, del ano, y de la garganta. Es transmitido por el contacto sexual- el sexo del pene, vaginal, anal u oral. Los hombres que muestran los síntomas de una infección de gonorrea tienen una descarga nublada del pene.

Continuado en la próxima página...

Si no es tratado inmediatamente, la gonorrea puede esparcir y puede infectar la próstata, la vesícula, los testes, y los riñones. Las mujeres que tienen gonorrea, a veces no mostrarán los síntomas de la enfermedad. A veces una descarga amarillo-verde resultará de una infección, sin embargo es a menudo desapercibido. La cerviz puede llegar a ser inflamada, sin producir cualquier otro síntoma. La gonorrea es diagnosticada generalmente por la orina y tratable con antibióticos de prescripción.

Si esté diagnosticado con el linfogranuloma o la gonorrea, es esencial que les informe a sus socios sexuales. Ambos de los socios sexuales necesitan recibir tratamiento.

El sífilis:

El sífilis es el ETS causado por una bacteria conocida como *Treponema pallidum*. El sífilis puede resultar en la muerte si no apropiadamente e inmediatamente tratado. El sífilis prospera en ambientes tibios y húmedos y es transmitida por el sexo vaginal, oral o anal. Hay 3 etapas de sífilis. En la etapa del principio de la infección, el individuo puede advertir una úlcera roja pero indolora (llamó un chancro) desarrollando en sus genitales. En la segunda etapa, un sarpullido de piel puede aparecer en el cuerpo, generalmente en las palmas o los pies. Durante la etapa latente de sífilis, es posible que no haya los síntomas notables. Finalmente, en la etapa tercera, si uno no obtiene la atención médica, puedes experimentar las complicaciones graves. La ceguera, el fallo del corazón, el daño del hígado, alboroto mental, e aún la muerte puede ocurrir en la etapa tercera si no se consigue el tratamiento médico. Un análisis de sangre es necesario para diagnosticar sífilis. El sífilis es curable, pero requiere la atención médica rápida en las primeras etapas.

El herpes genital:

El herpes es causado por el virus de *Herpes simplex* y es transmitido principalmente por vaginal, oral, o anal. El herpes es muy contagioso. Los individuos con herpes pueden tener desata de llagas. Es muy importante evitar el contacto con una llaga, pero el herpes también puede ser esparcido aún cuando una persona no tiene llagas ni síntomas. Aunque las llagas son dolorosas y un fastidio, los hombres son improbables de experimentar las complicaciones graves del virus. Sin embargo, las mujeres pueden tener un riesgo elevado del cáncer cervical. El herpes genital no es curable, sin embargo es evitable y existen medicinas antivirales que ayudan a reprimir los estallidos. La investigación muestra que ése tipo de Herpes, HSV-2, no pasan por condones de látex pero los condones no siempre cubren el área afectada entera.

Las verrugas genitales:

Las verrugas genitales son causadas por un virus llamada el papillomavirus humano, o PVH. Los investigadores han determinado que hay más de 100 tipos de PVH, con la mitad de ellos causando las infecciones genitales. PVH es primariamente transmitido por el sexo vaginal, anal u oral. Aún condones no siempre previenen el PVH, porque el virus es a menudo en piel que no es cubierto completamente. Después de infección, un individuo puede experimentar verrugas genitales 3-8 semanas después del contacto sexual. En mujeres, las verrugas aparecen generalmente en la parte inferior de la vagina, pero pueden estar también en los labios y la cerviz. En hombres, son encontrados comúnmente en los flanes, en el prepucio, o en el túnel del pene. Muchas personas infectadas con PVH no muestran los signos o síntomas.

Continuado en el otro lado...